Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Florule des environs de Beaumont et de Montbliart, par A. Hardy et Lebrun.

La végétation des environs de Beaumont et de Montbliart étant une des plus riches de notre flore, nous croyons utile de faire connaître ce qu'elle nous a fourni, d'autant plus que cette partie du pays n'a été, jusqu'à présent, que très-peu explorée, comparativement aux localités voisines.

Thuin, Philippeville, Mariembourg, Chimay, Avesnes même, étudiés par de courageux botanistes, forment un cercle parfaitement connu sous le rapport botanique. Mais il restait à fouiller la contrée comprise entre ces divers points, et c'est ce que nous avons fait. Tout d'abord, considérés au point de vue géologique, les alentours de Beaumont présentent des particularités remarquables. Ainsi nous trouvons des affleurements calcaires à Beaumont, Barbençon, Solre-Saint-Géry, Renlies et Rance; un sol formé de schiste ou de psammite à Montbliart, Sivry, Grandrieu, Leugnies, Froidchapelle, etc...; une portion sablonneuse à Sautin qui est le point le plus élevé du Hainaut méridional; enfin de grandes étendues argileuses et d'autres où domine le grès rouge.

Loin de nous la prétention d'avoir découvert toutes les richesses de notre champ d'exploration ; que de choses rares nous y sont probablement encore inconnues!

Cependant nous l'avons parcouru en tous sens; nous avons visité ses forêts, sondé ses marais et ses étangs, suivi ses cours d'eau, gravi ses rochers, etc., etc.

C'est avec regret que nous voyons presque partout les défrichements appauvrir notre domaine botanique. On dessèche les étangs et les marais, on détruit les boisements, on contrarie les cours d'eau. La végétation aborigène tend à disparaître, et un jour viendra, où l'herborisateur n'aura plus que le souvenir de tant de riches stations disparues pour toujours. Mais en attendant l'avenir, occupons-nous de ce que nous possédons encore.

Nous n'indiquerons que nos espèces les moins communes que nous avons nous-mêmes découvertes et auxquelles nous en ajouterons quelques-unes signalées par Hocquart, M. Michot, ou par la Société royale de Botanique, afin d'offrir un tableau le plus complet possible de notre végétation.

Nous avons eu soin de toujours préciser les localités avec la plus grande exactitude, chose qui n'est pas sans importance pour les progrès de la géographie botanique et les recherches des botanistes étrangers à nos cantons.

Nous témoignons ici notre vive reconnaissance à MM. Clavel, Cogniaux et Chabaut qui ont eu l'extrême obligeance de nous communiquer des renseignements.

Anemone ranunculoides L. — Bois ombragés près de Bonne-Espérance et à Hantes-Wiheries. — AR.

Ranunculus hederaceus L. — Prairies humides à Froid-Chapelle (*Cogniaux*), mares à Montbliart. — AR.

— *divaricatus* Schrk. — Hantes-Wiheries. — AC.

— *platanifolius* L. — Bois-le-Comte entre Froid-Chapelle et Virelles. — R.

— *sceleratus* L. — Mares à Montbliart. — AC.

Helleborus foetidus L. — Coteaux incultes à Froid-Chapelle. — R.

— *viridis* L. — Dans un pré à Coumagne près de Beaumont. — AR.

— Abondant dans le bois de Montignies-St-Christophe (*Chabaut*).

Actaea spicata L. — Bois à Beaumont (*Chabaut*).

Berberis vulgaris L. — Haies à Rance et à Beaumont. — R. — Se trouve également à Hantes-Wiheries et Montignies-St-Christophe.

Saponaria officinalis L. — Champs de pommes de terre à Montbliart.—AR.

Holosteum umbellatum L. — Coteaux et murs à Rance. — AR.

Stellaria nemorum L. — Bords de l'Eppe près de la forge de Montbliart. — AR.

Impatiens Noli-tangere L. — Vallée humide de la Fagne, entre Rance et Robechies. (*Soc. roy. de Bot.*). — Très-abondant par places.

Geranium pratense L. — Cette plante, que nous avons trouvée à Virelles le long de l'Eau-blanche, serait-elle indigène sur le jeu de balle de Montignies-St-Christophe?

Geranium sanguineum L. — Indiqué à Froid-Chapelle par Hocquart et M. Michot.

Monotropa Hypopitys L. — Bois de sapins à Beaumont, bois de chênes à Sivry. — AR. — Indiqué dans la Fagne, par Hocquart et M. Cogniaux. Nous en avons trouvé quelques pieds au bois de la *Godibellerie* à Renlies. La plante y était d'un blanc d'ivoire et velue.

Pyrola rotundifolia L. — Bois de la Queue de Rance et de la Fagne (*Soc. roy. de Bot.*).

— *minor* L. — La Fagne (*Hocquart* et *Soc roy. de Bot.*), *Bois-brûlé* à Solre-St-Géry. — AR.

Corydalis solida L. — Bois de Montignies-St-Christophe (*Chabaut*), Rance (*Cogniaux*). — AC.

Arabis Turrita L. — Débris de la tour Salamandre à Beaumont. — R.

Cardamine amara L. — Ruisseaux fangeux à Montbliart et Rance. — AC.

— *impatiens* L. — Prairies, haies et bois à Montbliart. — C.

Thlaspi perfoliatum L. — Beaumont. (*Hocquart*).

Senebiera Coronopus L. — Décombres et pied des murs à Montbliart. — C.

Viola tricolor L. — Champs à Montbliart et à Barbençon. — AC.

Genista pilosa L. — Renlies (*Soc. roy. de Bot.*), coteaux à Beaumont. — AR.

Anthyllis Vulneraria L. — Cette plante, qui pullule dans certains champs de Virelles, est rare à Beaumont et Solre-St-Géry.

Melilotus albus Desr. — Bords des chemins à Sautin et à Virelles.

Trifolium ochroleucum L. — Pelouses à Solre-St-Géry. — R.

— *striatum* L. — Pelouses entre Beaumont et Solre-St-Géry (*Soc. roy. de Bot.*). — AR.

Lathyrus sylvestris L. — Broussailles à La Louvière (Sivry). — AR.

— *Aphaca* L. — Haies à Montbliart, Solre-St-Géry, Hantes-Wiheries et Montignies. — AC.

Orobus niger L. — M. Chabaut dit l'avoir trouvé à Beaumont, au lieu dit *Fontinette*, il y a environ dix ans.

Onobrychys sativa Lmk. — Beaumont, Leugnies, Solre-St-Géry et Renlies. — AC.

Herniaria glabra L. — Champs marécageux à Solre-St-Géry (*Chabaut*). — AR.

Sedum elegans Lej. var. *virescens*. — Talus schisteux à Montbliart, Sivry, Solre-St-Géry et Rance. — AC.

Sempervivum tectorum L. — Un peu partout dans le rayon de cette Florule. — Indigène?

Cerasus Mahaleb L. — Pont du prince à Beaumont (*Soc. roy. de Bot.*), la Fagne de Chimay. — R.

Cerasus Padus L. — Parc de Beaumont. — AR. — Indigène?

Comarum palustre L. — Prairies marécageuses près du fourneau de Sautin. — RR.

Sanguisorba officinalis L — Le long de la Hantes entre Leval et Chaudeville. — AR.

Epilobium palustre L. — Marécages près de la forge de Montbliart. — AR.

Bupleurum falcatum L. — Trouvé à Montbliart par M. Michot! — R.

— *rotundifolium* L. — Indiqué à Beaumont par M. Michot.

Cicuta virosa L. — Le long de la chaussée de Rance à Chimay (*Michot*). — AR.

Helosciadium inundatum L. — Entre Renlies et Froid-Chapelle (*Soc. roy. de Bot.*), mares à Montbliart, lieu dit *Terne de Warenne*. — AC.

Orlaya grandiflora L. — Abondant dans les moissons des champs calcaires du Hainaut méridional.

Turgenia latifolia L. — On l'indique à Montignies-St-Christophe.

Viscum album L. — Commun dans nos environs. — Nous l'avons trouvé sur un Sorbier à Sivry.

Saxifraga granulata L. — Prairies à Montbliart, Sautin, Beaumont et Renlies. — AC.

Chrysosplenium oppositifolium L. — Ruisseaux et marais à Montbliart et Bourlers; bois à Montignies (*Chabaut*).

Chrysosplenium alternifolium L. — Bois de la Fache et lieu dit *Sart-le-mauvais* à Montbliart. — C. — Les deux espèces sont abondantes çà et là dans la Fagne.

Litorella lacustris L. — Étang du moulin de Rance (*Soc. roy. de Bot.*).

Vincetoxicum officinale Mönch. — Bois pierreux et ombragés à Beaumont et Solre-St-Géry. — AR. — Se trouve aussi à Hantes-Wiheries et dans la partie rocailleuse des bois de Montignies-St-Christophe, où il est abondant par places d'après M. Chabaut.

Gentiana germanica Willd. — Coteaux incultes à Sautin, au lieu dit *Blangnies*. — AC.

Cuscuta major DC. — Environs de Beaumont. — AR.

— *Epithymum* Murr. — Parasite sur *Genista tinctoria* à Montbliart (*Bernard*). — AC.

Anchusa italica Retz. — M. Chabaut l'aurait trouvé à Beaumont et Solre-St-Géry. — A rechercher dans les carrières.

Atropa Belladona L. — Forêt de Rance (*Hocquart*), bords des chemins à Froid-Chapelle, surtout lieu dit *Queue-de-Rance* (*Soc. roy. de Bot.*), Sartiau, commune de Thirimont. — AR. — Répandu dans toute la Fagne.

Datura Stramonium L. — Bords des chemins à Froid-Chapelle. — AR.

Hyoscyamus niger L. — Carrières et décombres à Solre-St-Géry, Renlies et Rance. — AC.

— — var. *agrestis* Kit. — Abondant dans la carrière du *Fraisier* à Solre-St-Géry.

Verbascum pulverulentum Vill. — Carrières de Beaumont et de Barbençon! (*abbé Carnoy*), Solre-St-Géry (*Michot!*).

Veronica acinifolia L. — Beaumont (*Soc. roy. de Bot.*).

— *peregrina* L. — Champs et lieux cultivés à Montbliart. — C.

— *montana* L — Bois à la Queue-de-Rance (*Soc. roy. de Bot.*).

— *scutellata* L. — Entre Rance et Sautin.

Limosella aquatica L. — Étang du moulin de Rance (*Soc. roy. de Bot.*). — AR.

Linaria Cymbalaria L. — Vieux murs à l'abbaye d'Aulne, débris d'une vieille forge à Montbliart. — AR. — Il suffit de voir les environs de Tournay pour ne plus douter de l'indigénat de cette plante.

Pedicularis sylvatica L. — Lieux frais à Montbliart, Rance, Sivry et dans toute la Fagne. — C.

— *palustris* L. — Assez commun dans les mêmes localités.

Rhinanthus Alectorolophus Poll. — Champ de seigle près du moulin de Rance (*Soc. roy. de Bot.*). — Abondant dans les anciens essarts à Montbliart, Sautin et dans la Fagne.

Orobanche Rapum Thuill. — Parasite sur *Sarothamnus scoparius* au *Fond-de-Madousie* près de Montbliart. — AC. — Beaumont. — R.

Lathraea squamaria L. — Bois de Montignies-St-Christophe. — AR., mais très-abondant par places (*Chabaut*), bois frais à Erpion. — R.

Salvia Verbenaca L. — Se trouve en abondance sur une montagne rocailleuse assez étendue, située au midi de Beaumont où nous le connaissons depuis longtemps. Nous ne doutons nullement de son indigé-

nat. M. Du Mortier, qui est de notre opinion, l'a aussi observé sur une montagne graveleuse à Bon-Secours, près de Péruwelz. — Les membres de la Société royale de Botanique ont passé, en 1863, à quelques mètres de la première station, et nous regrettons vivement qu'ils n'aient pu la vérifier eux-mêmes.

Calamintha menthaefolia Host. — Lieux incultes entre Beaumont et Thirimont. — AR.

Stachys germanica L. — Environs de Beaumont (*Michot*).

— *alpina* L. — Champs de pommes de terre à Montbliart, Rance et Sivry. — AC.

Brunella alba Pall. — Coteaux calcaires à Rance (*Michot*), Froid-Chapelle (*Hocquart*), bords de chemins au-dessus de la forge de Virelles. — AC.

Scutellaria galericulata L. — Bords de l'eau d'Eppe à Montbliart, Rieu-de-Fromont, et dans la Fagne. — AC.

— *minor* L — Marais à Rance (*Soc. roy. de Bot.*), bois de Rance (*Michot*), répandu dans toute la Fagne (*Hocquart* et *Cogniaux*).

Teucrium Chamaedrys L. — Broussailles à Beaumont (*Hocquart*).

Vaccinium Vitis-idaea L. — Bois à Montbliart et Grandrieu. — R.

Specularia hybrida L. — Moissons à Solre-St-Géry (*Soc. roy. de Bot.*), Renlies. — AR.

Sambucus racemosa L. — Répandu dans la Fagne (*Hocquart*), bois de Rance et de Montbliart. — AC.

Asperula odorata L. — Bois à Montbliart, Sivry et Sautin. — C.

Galium sylvaticum L. — Le long de la Hantes à Leval-Chaudeville. — AR.

— *spurium* L. — Indiqué à Beaumont par M. Michot.

Valerianella carinata Lois. — Haies à Montbliart au lieu dit *Barchamp*. — R.

Cirsium oleraceum L. — Le long de la Thure à Bersillies (*Chabaut*).

Lappa tomentosa Lmk. — Assez rare à Hantes-Wiheries, près de Grand-Pré (*Chabaut*), Montignies-St-Christophe.

Centaurea montana L. — Petit bosquet entre Beaumont et Solre-St-Géry.

Bidens cernuus L. — Bords des eaux au Court-Tournant, à Sautin et Montbliart. — AC.

Chrysanthemum segetum L. — Moissons et champs de pommes de terre à Froid-Chapelle, lieu dit *St-Antoine*, à Sivry, Fourbechies, Renlies. — AR.

Antennaria dioeca L. — Coteaux secs à Montbliart. — C.

Inula britannica L. — Marais dans un bosquet de peupliers au pont du prince à Beaumont. — R.

Scorzonera humilis L. — Pullule dans les prairies fraîches de Montbliart, de Sautin et de Rance.

Atriplex roseum L. — Indiqué à Froid-Chapelle par M. Michot.

Chenopodium Vulvaria L. — Murs à Beaumont. — AR.

— *urbicum* L. — M. Plon l'a indiqué, à M. Crépin, aux environs de Beaumont.

Blitum rubrum L. — Décombres près du château de Montbliart, où nous l'avons trouvé avec M. Cogniaux. — AR.

Parietaria officinalis L. — Vieux murs à l'abbaye d'Aulne. — R.

Daphne Mezereum L. — Bois de Mazi à Montbliart, bois près de Beaumont. — AR. — M. Cogniaux l'indique çà et là dans la Fagne, surtout en allant vers Montbliart.

— *Laureola* L. — Cette rareté de notre flore, que M. Michot a signalée à Montbliart, a été introuvable pour nous. Herborisant autour de ce village (1) depuis plusieurs années, nous osons presque certifier qu'elle ne s'y trouve plus, de même que *Taxus baccata*, qui y est aussi indiqué.

Hippuris vulgaris L. — Lieux marécageux à Solre-St-Géry. — R.

Euphorbia Cyparissias L. — Cette plante, qui est abondante dans certaines localités des environs de Chimay, ne se trouve, à notre connaissance, dans le canton de Beaumont, qu'à Montbliart et à la Queue-de-Rance. — AR.

Taxus baccata L. — Fourbechies et Vergnies (*Michot*). — Indiqué comme abondant dans les broussailles à Barbençon, au Porroir et à Renlies, par notre confrère et ami M. Chabaut, qui nous a dit en avoir vu des arbres dont le tronc mesurait plusieurs pieds de circonférence.

Sagittaria sagittifolia L. — Bords de l'Eppe à Montbliart et à la Fagnette, et dans les étangs de Rance et de Sautin (AC.); Fourbechies (*Soc. roy. de Bot.*).

Tulipa sylvestris L. — Pelouses et vieux murs à Beaumont. — AR. — On le signale aussi dans le parc.

Fritillaria Meleagris L. — On nous l'indique dans les prairies de Vieux-Sart à Sautin. — Jusqu'ici nous ne l'avons reçu que de M. Chabaut, qui l'a découvert aux environs de l'abbaye d'Aulne.

Ornithogalum umbellatum L. — Prairies à Montbliart et abondant surtout au lieu dit *Courtil-Pierre-Petit.*

Scilla bifolia L. — M. Cogniaux le signale à Bailièvre, etc.

---

(1) Lieu de naissance de l'un de nous.

Endymion non-scriptus L. — Bois et haies à Montbliart, Rance, etc. — C.

Allium ursinum L. — Pullule dans la forêt de Rance, le long de l'Eppe. (*J. B. Moreau*), bois de la *Fache*. — C.

Muscari racemosum L. — Selon M. Plon, il infesterait les champs aux environs de Beaumont.

Polygonatum verticillatum L. — La Fagne de Chimay, près de Montbliart, aux lieux dits *Fond-de-la-ferme* et *Fond-des-greffes* (*J. B. Hardy* et *J. Bernard*), bois de la *Fache* à Montbliart. — AR.

Maianthemum bifolium L. — Bois de la *Haie* à Sivry. — C.

Paris quadrifolia L. — Dans les bois des environs, où il est abondant. — Nous en avons trouvé plusieurs pieds ayant 5, 6 et 7 feuilles.

Tamus communis L. — Haies à Beaumont et surtout à Sautin.

Galanthus nivalis L. — Prairies près du fourneau de Sautin (AR.), haies à *La Ronce* près de Fourbechies (R.), à Beaumont et Leval-Chaudeville. — L'indigénat est assez douteux, vu que cette plante bulbeuse est souvent cultivée.

Orchis coriophora L. — Indiqué à Beaumont par Desmazières.

— *laxiflora* Lmk. — Prairies fraîches du *Goulot* à Beaumont (*Plon*), Hantes-Wiheries (*Michot*).

Ophrys arachnites Reichard. — Forêt de Rance. — R.

Gymnadenia conopsea L. — Prairies au Court-Tournant à Solre-St-Géry (*Soc. roy. de Bot.*).

Platanthera bifolia L. — Bois de Fourbechies et de Sivry. — AC.

— *montana* Schmidt. — Bois humides entre Renlies et Froid-Chapelle (*Soc. roy. de Bot.*), Montignies-St-Christophe et Beaumont. — AC.

Epipactis latifolia All. — Bois frais à Sautin, Sivry, Rance et Renlies. — AC.

Neottia ovata L. — Bois frais et prairies à Montbliart, Sivry et Montignies-St-Christophe. — A Montbliart, cette espèce présente des feuilles presque aussi grandes que celles de *Nuphar luteum*, chose qui nous a beaucoup étonnés. Serait-ce une variété ou une forme accidentelle, qui ne se produirait que lorsque l'épi est peu développé? Cependant la plante a un cachet particulier.

Neottia Nidus-avis L. — La Fagne de Chimay (AR.), abondant dans le bois de *Ranchère* près de Montignies-St-Christophe (*Chabaut*).

Potamogeton gramineus L. — Signalé à Renlies.

— *acutifolius* Link. — Froid-Chapelle (*Cogniaux*).

Lemna gibba L. — Étang du village de Rance (*Soc. roy. de Bot.*).

— *polyrrhiza* L — Même observation

Sparganium simplex Huds. — La Fagne (*Soc. roy. de Bot.*), bords de l'Eppe à Montbliart. — AR.

Carex elongata L. — La Fagne (*Soc. roy. de Bot.*).

— *pendula* Huds. — Bois bordant l'Eppe à Montbliart. — AR.

— *strigosa* Huds. — Indiqué à Beaumont.

— *Pseudo-Cyperus* L. — La Fagne! (*Soc. roy. de Bot.*), fossés à Montbliart, au lieu dit *Chemin-Dayette.* — R.

— *vesicaria* L. — Étangs à Montbliart. — C.

— *filiformis* L. — Prairies marécageuses à Montbliart au lieu dit *Sart-le-mauvais.* — RR.

Cladium Mariscus L. — Indiqué aux environs de Beaumont.

Eriophorum polystachium L. — Prés humides à Sautin. — AC.

Alopecurus fulvus Sm. — Bois humides entre Renlies et Froid-Chapelle (*Soc. roy. de Bot.*).

Catabrosa aquatica L. — Même observation.

Poa sudetica Vill. — Bois à Sautin et à la Queue-de-Rance (*Soc. roy. de Bot.*).

Bromus racemosus L. — Moissons le long de la route de Beaumont à Solre-St-Géry (*Soc. roy. de Bot.*).

Festuca heterophylla Lmk. — Bois aux environs de Beaumont. — AR.

— *sylvatica* Poll. — Même observation.

Blechnum Spicant L. — Çà et là, surtout dans la Fagne.

Scolopendrium vulgare Symons. — Murs à Solre-St-Géry et à Bersillies.

Asplenium Adianthum-nigrum L. — Carrières de Tymmont entre Beaumont et Leugnies. — AR.

Polystichum angulare Kit. var. *subtripinnatum.* — Talus schisteux près du moulin de Rance (*Soc. roy. de Bot.*).

Botrychium Lunaria L. — Bois *Jacques* près de Froid-Chapelle (*Cogniaux*).

Pilularia globulifera L. — Mares à Froid-Chapelle (*Cogniaux*). — AR.

Lycopodium clavatum L. — Bruyères à Vergnies. — R.

Equisetum Telmateia Ehrh. — Le long d'un ruisseau à Montbliart, au lieu dit *Courte-rue.* — AR.

— *sylvaticum* L. — Indiqué à Cerfontaine.

Chara fragilis Desv. — Étang de Rance (*Soc. roy. de Bot.*).

Nitella flexilis L. — Même observation.

Indication de quelques espèces observées en dehors du rayon de notre Florule.

Oenanthe aquatica L. — Étang de Soleilmont à Gilly. — AC.

Orlaya grandiflora L. — Moissons à Chatelineau. — AR.

Erica Tetralix L. — Camp de Dimechaux (France), à deux lieues des environs de Beaumont. — AR.

Datura Stramonium L. var. *Tatula* — Décombres à la Bouverie. — R.
Stachys alpina L. — Haies et champs à Gilly et à Fleurus. — AC.
Asperula cynanchica L. — Coteaux entre Ittre et Nivelles. — R.
Rumex maximus Schreb. — Bord de rivière à Bouffioulx.
Euphorbia Cyparissias L. — Campagne aride à Nivelles (quelques pieds); environs de Frameries (*Wattier*).
Buxus sempervirens L. — Lieux rocailleux à Bouffioulx. — R.
Ceterach officinarum Willd. — Vieux murs en ruines à Stavelot. — AR.
Lamium maculatum L. — Abondant dans un bois de sapins entre Visé et Argenteau et haies à Daelhem. — AR.

—

Nouvelles annotations à la florule des environs de Nivelles, par H. Dandois.

Stellaria nemorum L. — Bords des ruisseaux et lieux spongieux à Loupoigne, Baisy-Thy, Villers-la-Ville et Sart-Dames-Avelines.
Geranium macrorrhizum L. — Naturalisé depuis longtemps sur un ancien mur à Vieux-Genappe.
Polygala depressa Wend. — Bois, lieux herbeux et prairies spongieuses à Baisy-Thy, Bousval et Ways.
Fumaria densiflora DC. — Champ à Genappe (*Cogniaux*) et bords d'une haie à Ways.
Trifolium elegans Savi. — Assez communément mêlé au trèfle cultivé.
Lathyrus Aphaca L. — Environs de Nivelles (*A. Hardy*).
Onobrychis sativa L. — Lieux montueux incultes à Feluy.
Montia minor Gmel. — Champs frais à Loupoigne, Villers-la-Ville et Sart-Dames-Avelines.
Claytonia perfoliata Donn. — Bords d'un chemin sablonneux à Baisy-Thy.
Potentilla verna L. — Talus d'un fossé sablonneux à Loupoigne.
Centunculus minimus L. — Champs humides à Loupoigne (*Cogniaux* et *Dandois*).
Plantago lanceolata L. *forma ramosa*. — Champs de trèfle à Houtain, Bousval et Baisy-Thy.
Erythraea pulchella Sw. — Champs humides à Loupoigne (*Cogniaux* et *Dandois*).
Verbascum Thapsus L. — Bords de champs à Houtain et Baisy-Thy.